

individuelles Logo

Dr. med. dent. Bernhard Blaustein
Praxis für allgemeine Zahnmedizin

Flashanimationen

fertige Inhalte



Ihr Login

Weisheitszahnentfernung
Bei Weisheitszähnen - allen im Ober- oder Unterkiefer - handelt es sich um die letzten Keimzähne, die im menschlichen Kiefer zu finden sind. Sie sind im Alter von 17 bis 25 Jahren vollständig durchgebrochen. In manchen Fällen sind sie jedoch nicht durchgebrochen, sondern verbleiben im Kiefer. In diesen Fällen sind sie als Weisheitszähne bekannt. Weisheitszähne können Probleme verursachen, wenn sie nicht richtig positioniert sind. Sie können Schmerzen verursachen, wenn sie in die Weisheitszahnentasche (Pericoronitis) drücken. In manchen Fällen können sie auch Schäden an den angrenzenden Zähnen verursachen. In diesen Fällen ist die Entfernung der Weisheitszähne notwendig. Die Entfernung der Weisheitszähne ist eine Routineoperation, die von einem Zahnarzt durchgeführt werden kann. Die Operation ist in der Regel schmerzlos und wird mit einer örtlichen Betäubung durchgeführt. Die Heilung erfolgt in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen. In manchen Fällen kann es jedoch zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel Infektionen oder Nervenverletzungen. In diesen Fällen ist eine weitere Behandlung erforderlich. Die Entfernung der Weisheitszähne ist eine wichtige Maßnahme, um die Gesundheit der Zähne zu erhalten. Sie kann dazu beitragen, Schmerzen zu vermeiden und Schäden an den angrenzenden Zähnen zu verhindern. In manchen Fällen kann die Entfernung der Weisheitszähne auch dazu beitragen, das Risiko von Infektionen zu verringern. In diesen Fällen ist die Entfernung der Weisheitszähne eine wichtige Maßnahme, um die Gesundheit der Zähne zu erhalten. Sie kann dazu beitragen, Schmerzen zu vermeiden und Schäden an den angrenzenden Zähnen zu verhindern. In manchen Fällen kann die Entfernung der Weisheitszähne auch dazu beitragen, das Risiko von Infektionen zu verringern.



Broschüren u.
Checklisten

Social Bookmarks

Videoanimation